FOGLIO 429 MONDRAGONE

Servizio Geologico d'Italia (2025) - *Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, F.429 Mondragone*, ISPRA, Roma.
DOI: 10.15161/oar.it/xxxx-nfx80

ISPRA - SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
Organo Cartografico dello Stato (legge n° 68 del 2.2.1960)

CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Carta Ufficiale dello Stato - Tutti i diritti riservati

MONDRAGONE FOGLIO 429

della Carta 1:50.000 dell'I.G.M.

Regione Campania Servizio Geologico

IGAG CNR - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria

CNR ISMAR

Responsabili della convenzione: F. Pignatone[a] - ISPRA; M.L. Putignano[c] - CNR-IGAG (area emersa);
M. Sacchi[d] - CNR-ISMAR (area sommersa); L. Monti[a] (fino a settembre 2022), A. De Matteis[a] - Regione Campania
Coordinatori del progetto: F. Pignatone[a] - ISPRA; L. Monti[a] (fino a settembre 2022);
A. De Matteis[a] - Regione Campania
Coordinatore scientifico: M.L. Putignano[c] (area emersa); M. Sacchi[d] (area sommersa)
Redazione scientifica (foglio di superficie): S.I. Giano', M. Cesarano, M.L. Putignano[c] (area emersa);
M. Sacchi[d], S. Insinga[d], R. Tonielli[d] (area sommersa)
Redazione scientifica (foglio di sottosuolo dell'area emersa): A. Pietrosante[f], M.L. Putignano[c]
Analisti:
Area emersa: B. Giaccio[e] (Iong.), G. Fernandez[f], L. Monaco[c] (istopaleontologia), S.I. Giano', M. Mancini[e], M. Marino[e] (biostratigrafia), A. Pietrosante[f], M.L. Putignano[c] (litostratigrafia), A. Sulpizio[e] (tefrocronologia - medicina isotopica), M. Pappone[c] (archivio isotopi/geocronologia), M. Stefanelli[e] (archeologia del Paleolitico), A. Di Stefano[f] (biostratigrafia a nannofossili calcarei del Miocene medio/inferiore), G. Sisto[f] (geocronologia, ^{14}C)
Area sommersa: R. Tonielli[d] (coordinamento acquisizione e processing dati geofisici), G. Di Martino[d], S. Insinga[d] (geofisica marina), F. Molisso[c], M. Sacchi[d] (sismostratigrafia e analisi di facies), V. Di Donato[d] (coordinamento analisi delle microfaune), L. Ferraro[d] (micropaleontologia Plio-Pleistocene), D. Bertoni[d], G. Aiello[d], R. Pepe[d] (sedimentologia), G.F. Russo[d] (coordinamento biologia associazioni macrobentoniche), F. Ferrigno[d], F. Rendina[d] (geocostruzione coralligena), L. Donnarumma[d] (macrobenthos bentonico), D. Insinga[d], P. Cappelletti[d] (cenosi e mineralogia dei depositi), S. Alfonsi[d], A. De Falco[d] (chimica degli idrocarburi disciolti), A. De Biasi[d], V. Morra[d], M. Verde[d] (caratterizzazione dei reperti archeologici), C. Liberti[d] (geocronologia ^{14}C)

Subdivisione dei rilevamenti geologici: scala 1:10.000
Rilevatori: (a, b) F. Artegiani[a]; (a, b) G. Fagiolo[a]; (a, b) A. Pietrosante[f], (a, b, c) M.L. Putignano[c]; (c) R.M. Iacuzzo[c] (area emersa);
(d) S. Insinga[d], G. Di Martino[d], R. Tonielli[d] (area sommersa)
Rilevamenti eseguiti negli anni: 2021-2024
Informatizzazione dei dati: A. Pietrosante[f] (area emersa);
S. Insinga[d], G. Di Martino[d], R. Tonielli[d] (area sommersa)
Allestimento cartografico: InfoCartoGeitalia

1 - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Roma
2 - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - CNR-IGAG
3 - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine - CNR-ISMAR
4 - Regione Campania - Servizio Geologico e Difesa del Suolo, Napoli
5 - Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente (DiSTAR), Università degli Studi di Napoli Federico II
6 - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), Università degli Studi di Napoli Federico II
7 - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Catania
8 - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Scienze della Terra, Firenze
9 - Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DiST), Università degli Studi di Napoli Parthenope
10 - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche (DiSTABiF), Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Sessa Aurunca F° 416



Elaborato definitivo: 2025 Stampa: xxxx - 9999 Base Topografica realizzata dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA
Elaborazione dei dati del Database di Sintesi Nazionale (DBSN) dell'Istituto Geografico Militare - *Open Data Commons Open Database License ver. 1.0*
Progetto CARG - Legge 160/2019 Direttore responsabile: M. Sisclari (*ad interim* - 2025)

UNITÀ NON DISTINTE IN BASE AL RAZIONO DI PERTINENZA

DEPOSITI CONTINENTALI IN FORMAZIONE

DEPOSITO ANTROPICO
Materiali di riporto di attività antropiche; strutture in cemento di alvei fluviali rettificati; depositi di cava.
OLOCENE SUPERIORE p.p.

DEPOSITO ALLUVIONALE
Sabbie e ghiaie a prevalente composizione vulcanoclastica, ghiaie carbonatiche dei conoidi d'apice minori che bordano la piana costiera; limi e argille di piana inondabile (a tratti palustri), depositi di paleosuoli parzialmente o completamente colmati per interventi di bonifica e drenaggio antropico.
OLOCENE SUPERIORE p.p.

DEPOSITI DI SPIAGGIA
Sabbie da medie fini a grossolane, di origine vulcanoclastica e sedimentaria, e ghiaie-sabbiose formate da clasti ben arrotondati di pomici, scorie e calciari; sabbie medie e fini a luoghi limose, non cementate ed a composizione vulcanoclastica e sedimentaria costituenti il primo cordone costiero in corso di formazione e privo di vegetazione.
OLOCENE SUPERIORE p.p.

DEPOSITO DI VERSANTE
Ghiaie e sabbie a supporto clastico eterometrico scisto con clasti a spigoli vivi o subarrotondati a supporto di matrice limoso-argillosa e sabbiosa; la dimensione dei clasti varia da pochi cm fino a circa 10 cm. Lo spessore è variabile a secondo del contesto morfologico non supera i 5 metri.
OLOCENE p.p.

DEPOSITO COLLUVIALE
Sabbie limose e argillose con lenti e/o orizzonti ghiaioso-sabbiosi talora anche grossolani a composizione vulcanoclastica e con spessori variabili da pochi cm fino ad oltre 1 m. In prossimità dei versanti carbonatici sono presenti orizzonti discontinui di travertini e/o calcare subaerondotali. Localmente sono presenti frammenti ceramici e materiale da impasto (terracotta).
OLOCENE p.p.

DEPOSITO DI FRANA
Accumulo gravitativo di materiale eterogeneo ed eterometrico a supporto clastico o con matrice argilloso-sabbiosa.
OLOCENE p.p.

DEPOSITI CONTINENTALI COMPLETAMENTE FORMATI

DEPOSITO EOLICO
Sabbie medie e fini a luoghi intercalate a sedimenti sabbioso-limosi. Localmente (Piana del Garigliano) sono presenti clasti calcarei e quarzosi. Si interdigitano, a deposti argilloso-limoso-sabbiosi palustri di interdune con locali copertore pedogenetiche, non cartograbili. Rappresentano un deposito di duna costiera relitta che non conserva la forma originaria a causa dell'intensa antropizzazione dell'area. Localmente il deposito è interessato ed fossato dalla vegetazione arborea ed arbustiva.
OLOCENE p.p.

DEPOSITO PALUSTRE
Limi e argille, talora sabbia limoso-argillosa con frequenti livelli torbosi di origine palustre e con intercalazioni di lenti ed orizzonti di sabbia limosa e localmente ghiaiosa di origine alluvionale prodotta da eventi di esondazione. Lo spessore è variabile, affiorando non supera i 2 m, in sondaggio raggiunge complessivamente circa 3 m.
OLOCENE p.p.

DETRITO DI FALDA
Ghiaie eterometriche a clasti angolosi, a composizione prevalentemente carbonatica da addensate a debolmente cementate, da matrix supportati a clast supported, a matrice sabbioso ghiaiosa carbonatica e subordinatamente vulcanoclastica, in prossimità dei massive a stratificate e strattidi. Il deposito è disposto in lembi localizzati alla base dei versanti carbonatici e costituisce falde di detrito stabilizzate. Lo spessore delle piane dei fiume Volturno e Garigliano. Lo spessore varia da pochi metri fino ad alcune decine di metri.
PLEISTOCENE SUPERIORE? p.p. - OLOCENE p.p.

DEPOSITI DI ORIGINE MISTA: DI *DEBRIS-FLOW* ED TORRENTIZIO
Ghiaie eterometriche da angolose a subarrotondate, da massive a stratificate; sabbie grossolane-a ghiaie-sabbiose stratificate con strutture erosivo-deposizionali legate a processi di tipo gravitativo o da flusso idrico trattivo. Lo spessore del deposito è altamente variabile da alcuni metri.
PLEISTOCENE SUPERIORE? p.p. - OLOCENE p.p.

DEPOSITI DELLE AREE SOMMERSE

AMBIENTE DELTIZIO-LITORALE

DEPOSITO DI FRONTE DEL DELTA
Depositi localizzati principalmente allo sbocco del Fiume Volturno, a profondità comprese tra 1-3 m e 20 m. I sedimenti sono costituiti prevalentemente da sabbie da medie a grossolane, ben cernite, con frammenti di molluschi, in prossimità della foce, e sabbie medie e fini più o meno limose verso il largo, che vengono relativamente data base del moto ondoso. Questi depositi formano localmente barre costiere con blande morfologie a cresta e solco, che si sviluppano parallelamente alla linea di costa a luoghi in continuità con i depositi di spiaggia e depositi di piattaforma interna. La composizione mineralogica della frazione sabbiosa presenta un'associazione prevalentemente silicoclastica-vulcanoclastica, con clinopirosseno, calcite, K-feldspato, quarzo e quantità accessorie di apatite, granato, anfiboli, biotite e magnetite. Sono presenti associazioni bentoniche che includono *Ammonicae (A. beccarii, A. tepida, A. parkinsoniana), Bolivina* spp. *(B. spathulata, B. variabilis), Pseudotriloculina rotunda, Quinqueloculina seminulum, Q. stelligera, Spiroloculina canaliculata, Triloculina tricarinata, Cibicides lobatulus, Elphidium crispum, Lagenidae, Lagenocythere multipunctata, Neocythere(Aurila) subulata, Palmoconcha turbida, Semicythereis sulcata.*
OLOCENE SUPERIORE

AMBIENTE LITORALE

DEPOSITO DI SPIAGGIA SOMMERSA
Sabbie medio-fini e fini ben classate di composizione quarzoso feldspatica con componente carbonatica, subordinata, da moderatamente cernite a ben cernite, a tessitura omogenea. Il limite della spiaggia sommersa è attorno ai -10/-15 m di profondità, oltre il piede della barra costiera più esterna. Il profilo batimetrico della spiaggia sommersa varia in funzione del regime morfodinamico del litorale con alternanza di sistemi barra-truogolo e barra basso/fondo. Questi depositi formano localmente barre costiere con blande morfologie a cresta e solco, che si sviluppano parallelamente alla linea di costa a luoghi in continuità con i depositi di spiaggia e depositi di piattaforma interna. La composizione mineralogica della frazione sabbiosa presenta un'associazione prevalentemente silicoclastica-vulcanoclastica, con clinopirosseno, calcite, K-feldspato, quarzo e quantità accessorie di apatite, granato, anfiboli, biotite e magnetite. Sono presenti associazioni bentoniche che includono *Ammonicae (A. beccarii, A. tepida, A. parkinsoniana), Bolivina* spp. *(B. spathulata, B. variabilis), Pseudotriloculina rotunda, Quinqueloculina seminulum, Q. stelligera, Spiroloculina canaliculata, Triloculina tricarinata, Cibicides lobatulus, Elphidium crispum, Lagenidae, Lagenocythere multipunctata, Neocythere(Aurila) subulata, Palmoconcha turbida, Semicythereis sulcata, Xestoleberis communis, Loxoconcha affinis, Palmoconcha turbida, Leptocythere crepidula, Xestoleberis plana, Cytheridea neapolitana.*
OLOCENE SUPERIORE

CORPO LITODE ORGANOGENO, BIOHERMA
Depositi costituiti da incrostazioni tipiche del coralligeno sessile che formano zone rilevate e a luoghi terrazzate con produzione organogena in situ e deposito bioclastico associato. Questi depositi sono presenti in particolare nell'area a NW di Punta Cavalli, a profondità comprese tra circa 30 e 40 m, e nell'area a SW di Punta Cavalli, a circa 6 m dal piede della barra costiera più esterna. Il profilo batimetrico della spiaggia sommersa varia in funzione del regime morfodinamico del litorale con alternanza di sistemi barra-truogolo e barra basso/fondo. Questi depositi formano localmente barre costiere con blande morfologie a cresta e solco, che si sviluppano parallelamente alla linea di costa a luoghi in continuità con i depositi di spiaggia e depositi di piattaforma interna. La composizione mineralogica della frazione sabbiosa presenta un'associazione prevalentemente silicoclastica-vulcanoclastica, con clinopirosseno, calcite, K-feldspato, quarzo e quantità accessorie di apatite, granato, anfiboli, biotite e magnetite. Sono presenti associazioni bentoniche che includono *Ammonicae (A. beccarii, A. tepida, A. parkinsoniana), Bolivina* spp. *(B. spathulata, B. variabilis), Pseudotriloculina rotunda, Quinqueloculina seminulum, Q. stelligera, Spiroloculina canaliculata, Triloculina tricarinata, Cibicides lobatulus, Elphidium crispum, Lagenidae, Lagenocythere multipunctata, Neocythere(Aurila) subulata, Palmoconcha turbida, Semicythereis sulcata, Xestoleberis communis, Loxoconcha affinis, Palmoconcha turbida, Leptocythere crepidula, Xestoleberis plana, Cytheridea neapolitana.*
OLOCENE SUPERIORE

DEPOSITO BIOCLASTICO
Sabbie e sabbie ghiaiose bioclastiche più o meno grossolane e subordinatamente sabbie fini bioclastiche in scarsa matrice limosa in parte originate dal disfacimento delle comunità bentoniche che formano le biocostruzioni della "Sinuessa" (bg). Le facies bioclastiche più grossolane si rinvengono pertanto all'interno delle depressioni morfologiche che separano le biocostruzioni, mentre le facies più fini si rinvengono in corrispondenza delle porzioni frontali orientate le biocostruzioni. Il bioclastico che forma questo deposito è rappresentato in particolare da frammenti di dimensioni variabili di bivalvi (ad. es. *Lithophaga lithophaga, Chama gryphoides, Striarca lactea*), gasteropodi (ad. es. *Arca noae, Spondylus gaederopus*), alghe rosse (ad. es. *Lithothamnion* sp.) e briozoi. Le associazioni a foraminiferi bentonici sono caratterizzate dalla dominanza di *Rosalinidae* gairnardi, cui si accompagnano *Ephidium crispum, Ammonia beccarii, Adelosina elegans, Ammonia parkinsoniana, Adelosina rotunda, Adelosina mediterranensis, Rosalina bradyi*. Le ostracofaune sono principalmente rappresentate da *Semicytherura incongruens, Pontocyther turbida, Palmoconcha turbida, Xestoleberis communis, Loxoconcha affinis, Leptocythere crepidula, Xestoleberis plana, Cytheridea neapolitana, Xestoleberis communis, Xestoleberis plana*. Tra i costituenti si rinvengono moderate quantità di clinopirosseno, quarzo, calcite e K-feldspato e subordinatamente apatite e magnetite.
OLOCENE SUPERIORE

UNITÀ TETTONICA DI MONTE S. ANNA-FORCELLA

AREE SOMMERSE

- depositi di stazionamento alto (HST)
- substrato vulcanico indifferenziato delle aree sommerse

SEQUENZA DEPOSIZIONALE TARDO QUATERNARIA

- sistema vesuviano-flegreo (VEF) (Olocene p.p.)
- sistema di Baia Domizia - sistema di Furoni (Olocene p.p. - Pleistocene Sup. p.p.)
- sistema di Taverna (Pleistocene Superiore p.p.)
- Tufo Grigio Campano (Pleistocene Superiore p.p.)
- Tufo Giallo Napoletano (Pleistocene Medio p.p.)

DEPOSITI MARINI MESSINIANI

- formazione di S. Francesco (Miocene Superiore p.p.?)

UNITÀ TETTONICA DI MONTE S. ANNA-FORCELLA

- formazione di M. Cinquemiglia (Oligocene Superiore p.p.)
- complesso di M. Orsi-Cagnulo (Oligocene superiore - Miocene Inferiore p.p.)

UNITÀ TETTONICA DEL MONTE MASSICO

- arenarie di M. Massico (Miocene Medio)
- unità terrigena e carbonatica (Burdigaliano medio-Tortoniano p.p.)
- unità carbonatica (Giurassico Inferiore - Cretacico Superiore p.p.)

STRUTTURE MIOCENICO - PLIOCENICHE

- Sovrascorrimento principale, incerto o sepolto
- Sovrascorrimento di importanza minore

STRUTTURE PLIOCENICO - QUATERNARIE

- Faglia diretta, incerta o sepolta
- Faglia, incerta o sepolta
- Faglia diretta, incerta o sepolta che dislocа il TGC individuata nel sondaggi

Strutture sepolte della Piana del Volturno individuate in sismica

- Faglia diretta che dislocа il substrato Mesozoico-Cenozoico e i depositi plio-pleistocenici
- Fronte del delta sommerso
- Sprofondamento
- Sondaggio geognostico CARG (profondità in metri)
- Traccia delle sezioni geologiche



SCHEMA TETTONICO

SCHEMA CRONOSTRATIGRAFICO



SOVRASSEGNI DELLE UNITÀ QUATERNARIE


deposito alluvionale (sabbia)
deposito eolico (sabbia)
deposito alluvionale (ghiaia e sabbia/sabbia e ghiaia)
deposito lacustre/palustre (limo e argilla)
deposito alluvionale (sabbia limosa)
deposito marino (sabbia e ghiaia)
deposito palustre (sabbia limosa)
deposito di spiaggia (sabbia e ghiaia/ghiaia e sabbia)
stratificazione diritta
stratificazione orizzontale diritta
stratificazione inclinata
stratificazione a festone
stratificazione a basso angolo
stratificazione obliqua
stratificazione a basso angolo
stratificazione a festone