

041 Campo di Cepino e Campo di Trellica

Depressioni di angine tettono-carsiche colmate di sedimenti piroclastici e delimitati da rilievi calcareo dolomitici del Giurassico.



Provincia / CM	Benevento
Comune	Tocco Caudio
Località	Campo di Cepino
Foglio IGM 1:50.000	431
Coordinata x	463889
Coordinata y	4553569
Latitudine	41°7'57,43"N
Longitudine	14°34'11,13"E






Associazioni litologiche

RILEVANZA	
carsica	si
geochimica	
geologia applicata	si
geologia marina	
geomorfologica	si
idrogeologica	
mineraria	
paleontologica	
stratigr-strutturale	
vulcanologica	

VALENZA	
archeologica	primaria
architettonica	
botanica	
culturale	
didattica	primaria
ercusionistica	
faunistica	
naturalistica	secondaria
paesaggistica	primaria
storica	
turistica	



Panoramica di Campo Cepino e Campo di Trellica. Si può osservare il dosso di separazione tra i due campi carsici e la differenza di quota tra il fondo del Campo di Trellica e quello di Cepino (da Google Earth).



Il Campo di Cepino (foto CAI Benevento sentieri).

Sebbene il massiccio del Taburno-Camposauro sia interessato da una diffusa presenza di morfologie carsiche epigee e nonostante l'elevato potenziale della speleogenesi, non sono al momento noti sistemi carsici ipogei di rilievo. Viceversa, diffuse sono le morfologie carsiche epigee rappresentate da campi solcati e scannellature ed esempi di un carsismo fossile e di un carso sepolto sotto depositi piroclastici che mantellano il massiccio. Le morfologie carsiche epigee più mature e sviluppate sono rappresentate dal Campo di Trellica e di Cepino sul Monte Taburno e Il Campo sul Camposauro. Le due conche di Trellica e di Cepino sono contigue e situate sugli ultimi contrafforti settentrionali del Taburno a sud di Serra del Ceraso nell'estremo settore occidentale del territorio comunale di Tocco Caudio. Le due conche sono bordate dal crinale dei monti Cardito (1.137 m) e Serra del Ceraso (1.220 m), a Nord, e dalle propaggini del Colle dei Paperi (1.323 m), a Sud. Sono divise da un dosso calcareo e comunicano attraverso due piccole selle. Il fondo è riempito da sedimenti di coltre eluvio-colluviale, marne, argille con intercalazioni di lenti di piroclastiti quaternarie di provenienza flegrea e, forse, vesuviana. La genesi di queste due conche tettono-carsiche è in relazione a una faglia con andamento NO-SE, che dà luogo al lato meridionale, e di una faglia allineata NE-SO che, dalla parete orientale della Serra del Ceraso, delimita il dosso che separa il Campo di Trellica da quello di Cepino. I due campi sono di dimensioni diverse. Più piccola la conca del Campo di Trellica, trilobata; di maggiori dimensioni l'adiacente Campo di Cepino di forma allungata in direzione NO-SE. Il Campo di Trellica è cosparso di numerose morfologie doliniformi (sinkhole), svasate verso l'alto che si formano per richiamo verso il basso della coltre eluvio colluviale ad opera delle acque di infiltrazione che vengono smaltite in profondità attraverso il substrato carsificato.